بسمه تعالی
گروه سلامت و بهداشت استان آذربایجان شرقی

فصل پنجم : پیشگیری از رفتارهای پرخطر (بارم نوبت خرداد ۴ نمره)

درس یازدهم : مصرف دخانیات و الکل (بارم نوبت دوم ۲ نمره)

مفهوم "خ" در سال طرح سوال : سوالات نهایی خارج از کشور می باشد.

سال طرح سوال	متن سوال	شماره صفحه
	مصرف دخانیات و الکل	
خرداد ۹۸ (خ)	دخانیات فقط منحصر به سیگار است. نادرست (نیست)	۱۲۹
دی ۹۸ خرداد ۱۴۰۰ خرداد۱۴۰۱(خ)	مواد بدون دود نظیر تنباکوی جویدنی، مکیدنی و یا استنشاقی ماده دخانی محسوب نمی شوند. نادرست (محسوب می شوند)	۱۲۹
دی ۱۴۰۰(خ)	تنباکوی جویدنی و مکیدنی، جزو مواد دخانی محسوب نمی‌شوند. نادرست (می شوند)	۱۲۹
دی ۱۴۰۱	بزرگترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم، ..... است. دخانیات	۱۲۹
دی ۱۴۰۰	بزرگترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم (دخانیات - الکل) است.	۱۲۹
دی ۹۷	بزرگ ترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم می باشد. دخانیات	۱۲۹
شهریور ۱۴۰۰	منظور از دخانیات چیست؟ دخانیات فقط منحصر به سیگار نیست، بلکه هر ماده و یا فراورده-ای که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل دهنده آن، گیاه توتون و یا تنباکو یا مشتقات آن باشد جزو دخانیات محسوب می‌شود.	۱۲۹
خرداد ۱۴۰۱ خرداد ۱۴۰۱(خ)	از چه گیاهانی برای تولید دخانیات استفاده می کنند؟ یک مورد نام ببرید. توتون و تنباکو	۱۲۹
دی ۱۴۰۱(خ)	دو نمونه از مواد دخانی بدون دود را نام ببرید؟ تنباکوی جویدنی، مکیدنی و یا استنشاقی	۱۲۹
	سیگار	
شهریور ۹۹	قلیان پرمصرف ترین انواع مواد دخانی در سراسر جهان است. نادرست (سیگار پرمصرف ترین .....)	۱۲۹
خرداد ۹۸	پرمصرف ترین ماده دخانی در سراسر جهان ..... است. سیگار	۱۲۹
دی ۱۴۰۰(خ)	پرمصرف ترین انواع مواد دخانی در سراسر جهان چیست؟ سیگار	۱۲۹
خردادماه ۱۴۰۲	به پرسش‌های زیر در رابطه با دخانیات، اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن پاسخ دهید. الف. مصرف کدام ماده دخانی دروازه‌ی ورود به اعتیاد است؟ سیگار	۱۲۹
شهریور ۹۹	تجمع ذرات ریز موجود در سیگار در ریه‌ها، پوسته ضخیم قهوه‌ای رنگی را تشکیل می‌دهد که ..... نامیده می‌شود. قطران	۱۳۰
دی ۱۴۰۰	ماده ..... موجود در مواد دخانی باعث بروز سرطان لب می‌شود. آرسنیک	۱۳۰
خرداد ۱۴۰۰	نیکوتین موجود در سیگار باعث افزایش بروز سکته قلبی و (افزایش - کاهش) قند خون می‌شود.	۱۳۰
دی ۹۷	کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار اعتیادآور است؟ ۱. سیانیدریک اسید ۲. آرسنیک ۳. آمونیاک ۴. نیکوتین	۱۳۰
خرداد ۹۸	ج. کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار باعث بروز سرطان لب می‌شود؟ ۱. سیانیدریک اسید ۲. آرسنیک ۳. آمونیاک ۴. نیکوتین	۱۳۰
شهریور ۹۸	کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه نقش دارد؟ ۱. سیانیدریک اسید ۲. آرسنیک ۳. آمونیاک ۴. نیکوتین	۱۳۰
شهریور ۹۹ شهریور ۱۴۰۰	کدام ماده اعتیادآور دخانیات، در تشدید سینوزیت و التهاب نواحی گوش و حلق و بینی سهم بسزایی دارد؟	۱۳۰

	۱. آمونیاک ۲. نیکوتین ۳. کربورهای هیدروژن ٤. سیانیدریک اسید	
خرداد ۱٤۰۰	کدام ماده اعتیاد آور دخانیات، در فلج شدن حرکات مژک های داخل مخاط بینی نقش دارد؟ ۱. کربورهای هیدروژن ۲. نیکوتین ۳. سیانیدریک اسید ٤. آمونیاک	۱۳۰
دی ۱٤۰۰	ماده اعتیادآور دخانیات کدام است؟ ۱. نیکوتین ۲. قطران ۳. آمونیاک ٤. سیانیدریک اسید	۱۳۰
دی ۱٤۰۰(خ)	کدام گزینه از اثرات نیکوتین مواد دخانی است؟ ۱. افزایش قند خون ۲. سرطان لب ۳. پوسته ضخیم قهوه ای رنگ در ریه ها ٤. آسیب جبران ناپذیر به چشم	۱۳۰
خرداد۱٤۰۱(خ)	کدام یک از مواد سمی موجود در مواد دخانی در ایجاد سرطان دخالت ندارد؟ ۱. کربورهای هیدروژن ۲. قطران ۳. آرسنیک ٤. آمونیاک	۱۳۰
خرداد ۹۸	کدام ماده از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه ها است؟ آمونیاک	۱۳۰
خرداد ۹۸ دی ۹۸	کدام ماده سبب تشکیل پوسته ضخیم قهوه ای رنگ در ریه ها می‌گردد؟ قطران	۱۳۰
خرداد ۹۸ خرداد ۹۸ (خ)	کدام ماده به هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و تنفس را مختل می‌کند؟ سیانیدریک اسید (جوهر بادام تلخ)	۱۳۰
خرداد ۹۸ (خ)	کدام ماده سبب انقباض عروق داخل بینی و فلج شدن حرکات مژک‌های داخل مخاط بینی می‌شود؟ نیکوتین	۱۳۰
خرداد ۹۸ (خ) شهریور ۹۹ خرداد ۱٤۰۰ خرداد ۹۹ (خ)	کدام ماده در بروز سرطان لب نقش دارد؟ آرسنیک	۱۳۰
شهریور ۹۸ خرداد ۹۹	قطران چیست؟ ذرات ریز موجود در سیگار در ریه‌ها جمع می‌شوند و پوسته ضخیم قهوه‌ای رنگی را تشکیل می دهد که قطران نامیده می‌شود و حاوی عوامل سرطان زا است.	۱۳۰
شهریور ۹۸(خ)	هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام ماده سمی موجود در مواد دخانی است؟ الف. نوعی گاز سیگار است که در بروز سرطان لب نیز نقش دارد. آرسنیک ب. پوسته ضخیم قهوه ای رنگی را تشکیل می دهد و حاوی عوامل سرطان زا است. قطران (تار) ج. ماده اعتیاد آور دخانیات است و باعث افزایش قند خون می شود. نیکوتین	۱۳۰
دی ۹۸	الف- این ماده کشنده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و وارد ریه ها و سپس خون می شود. سیانیدریک اسید (جوهر بادام تلخ) ب - از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه است. آمونیاک	۱۳۰
خرداد ۹۹	هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام ماده موجود در دود سیگار است؟ الف. این ماده سبب انقباض عروق داخل بینی و فلج شدن حرکات مژک‌های داخل مخاط بینی می‌شود؟ نیکوتین ب. نوعی گاز سیگار است که از طریق ریه، کبد، کلیه ها و طحال جذب بدن می شود. آرسنیک	۱۳۰

<table>
<tr><td>خرداد ۹۹</td><td>جدول زیر در رابطه با برخی از مضرترین مواد سمی موجود در مواد دخانی است .هریک از موارد سمت راست با یکی از عبارت های سمت چپ ارتباط منطقی دارد. شماره مربوط به عبارت مناسب را در برگه پاسخ بنویسید.
<table>
<tr><th>موارد</th><th>عبارت ها</th></tr>
<tr><td>الف. آرسنیک ۲</td><td>۱. همان ماده اعتیادآور موجود در سیگار است.</td></tr>
<tr><td>ب. آمونیاک ٤</td><td>۲. نوعی گاز در سیگار است که در بروز سرطان لب نقش دارد</td></tr>
<tr><td>ج. مواد رادیواکتیو (پرتوزا) ۳</td><td>۳. این تشعشات از عوامل اصلی ایجاد سرطان است.</td></tr>
<tr><td>د. نیکوتین ۱</td><td>٤. از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافتها به ویژه ریه است.</td></tr>
</table></td><td>۱۳۰</td></tr>
<tr><td>دی ۹۹</td><td>در مورد مصرف دخانیات به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الف. کدام ماده سمی موجود در سیگار باعث افزایش قند خون می شود؟ نیکوتین
ب. نام گازی در سیگار که در بروز سرطان لب نقش دارد را بنویسید. آرسنیک</td><td>۱۳۰</td></tr>
<tr><td>خرداد ۱٤۰۰</td><td>هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام یک از مواد سمی موجود در مواد دخانی است؟ نام هر ماده را در پاسخ نامه بنویسید.
الف. نوعی گاز در سیگار است که از طریق ریه، کبد، کلیه ها و طحال جذب بدن شده و پس از دو هفته در پوست، مو و استخوان جایگزین می شود. آرسنیک
ب. این ماده کشنده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و وارد ریه ها و سپس خون می شود و تنفس را مختل می کند. سیانیدریک اسید
ج. از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها به ویژه ریه در جریان استعمال دخانیات است. آمونیاک</td><td>۱۳۰</td></tr>
<tr><td>شهریور ۱٤۰۰</td><td>در مورد مواد سمی موجود در دخانیات به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
الف. کدام ماده سبب تشکیل پوسته ضخیم قهوه‌ای رنگ در ریه ها می گردد؟ قطران
ب. کدام ماده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و تنفس را مختل می‌کند؟
سیانیدریک اسید (جوهر بادام تلخ)</td><td>۱۳۰</td></tr>
<tr><td>خرداد ۱٤۰۱</td><td>کدام ماده سمی موجود در مواد دخانی، در افزایش قند خون نقش دارد؟ نیکوتین</td><td>۱۳۰</td></tr>
<tr><td>شهریور۱٤۰۱</td><td>آرسنیک موجود در سیگار پس از دو هفته در کدام اندام‌های بدن جایگزین می‌شود؟ (دو مورد) پوست- مو – استخوان</td><td>۱۳۰</td></tr>
<tr><td>شهریور۱٤۰۱(خ)</td><td>با توجه به کلمه‌های داخل پرانتز، واژه مناسب و مربوط به هر عبارت را مشخص کنید و در برگه پاسخ بنویسید.
(آمونیاک – نیکوتین – کربورهای هیدروژن – سیانیدریک اسید – آرسنیک)
الف. نام گازی در سیگار که در بروز سرطان لب نقش دارد. (.....) آرسنیک
ب. این ماده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و وارد ریه‌ها و خون می‌شود و تنفس را مختل می‌کند. (.....) سیانیدریک اسید
ج. از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت‌ها به ویژه ریه در جریان استعمال دخانیات است. (.....) آمونیاک
د. ماده‌ای در سیگار که باعث افزایش بروز سکته قلبی و افزایش قند خون می‌شود. (.....) نیکوتین</td><td>۱۳۰</td></tr>
<tr><td>دی ماه ۱٤۰۱</td><td>الف. کدام ماده مضر دود سیگار می‌تواند روی پوست، عوارض جبران ناپذیری داشته باشد؟
مواد رادیواکتیو (پرتوزا)</td><td>۱۳۰</td></tr>
</table>

	ب. بر طبق تحقیقات، اثر دود دسته سوم بیشتر با کدام مادهٔ مضر موجود در سیگار ایجاد می‌شود؟ نیکوتین	
خردادماه ۱۴۰۲	کدام مادهٔ مضر دود سیگار و قلیان می‌تواند در ایجاد تحریک و تخریب بافت‌ها به ویژه ریه نقش ایفا کند؟ آمونیاک	۱۳۰
خردادماه۱۴۰۲(خ)	اثرات مخرب آمونیاک موجود در مواد دخانی را بنویسید. تحریک و تخریب بافت‌ها به ویژه ریه	۱۳۰
خردادماه ۱۴۰۲	کدام مادهٔ موجود در دود سیگار، در افزایش بروز بیماری ناشی از بسته شدن عروق اصلی تغذیه کنندهٔ قلب نقش دارد؟ نیکوتین	۱۳۰
خردادماه ۱۴۰۲	به پرسش‌های زیر در رابطه با دخانیات، اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن پاسخ دهید. الف. مصرف کدام ماده دخانی دروازهٔ ورود به اعتیاد است؟ سیگار	۱۳۰
شهریورماه۱۴۰۲	نقشه مفهومی زیر را با توجه به اطلاعات کتاب درسی تکمیل کنید. مضرترین مواد سمی موجود در مواد دخانی (الف) | (ب) | آمونیاک | (ج) پوسته ضخیم قهوه‌ای در ریه‌ها | ماده اعتیادآور دخانیات | (د) | سرطان لب الف. قطران (تار) ب. نیکوتین ج. آرسنیک د. ایجاد تحریک و تخریب بافت ریه	۱۳۰
دی ۱۴۰۱(خ)	هر یک از عبارت‌های زیر مربوط به کدام یک از مضرترین مواد سمی موجود در مواد دخانی است؟ الف. سبب فلج شدن حرکات مژک‌های داخل بینی می‌شود. نیکوتین ب. از طریق ریه، کبد، کلیه‌ها و طحال جذب می‌شود. آرسنیک ج. بر روی ریه، چشم، خون و پوست عوارض جبران ناپذیری باقی می‌گذارد. مواد رادیواکتیو (پرتوزا) د. خطر ابتلا به سرطان در تمام بافت‌های بدن به ویژه مجاری تنفسی را تشدید می‌کند. کربورهای هیدروژن	۱۳۰
دی ۱۴۰۲	نمودار زیر در مورد برخی از مضرترین مواد سمی موجود در سیگار میباشد. موارد خواسته شده را در پاسخبرگ بنویسید. الف(قطران)یا تار ب(نیکوتین) ج(تحریک و تخریب بافتها به ویژه ریه	۱۳۰
دی ۱۴۰۲	چگونه سیگارهای الکترونیکی موجب جراحات صورت، شکستگی فک و دندانها می شوند؟	۱۳۱

	در اثر انفجار باتری این محصولات	
	قلیان	
دی ۹۹	ج. چرا تنباکوهای میوه‌ای می‌توانند باعث سرطان و انواع بیماری های خطرناک شوند؟ به دلیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آنها	۱۳۳
شهریور ۱۴۰۰	مصرف متناوب قلیان نیز در فرد مصرف کننده، ایجاد وابستگی می کند. درست	۱۳۳
خرداد ۹۸ دی ۹۸ خرداد ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰	چرا استفاده از قلیان با تنباکوهای میوه ای اثرات زیان بارتری دارد؟ افزودنی های شیمیایی موجود در تنباکوهای میوه ای چه عوارضی برای شخص مصرف کننده دارند؟ علت مضر بودن مصرف تنباکوهای میوه ای در قلیان چیست؟ چرا خطر مصرف تنباکوهای میو ه ای بیشتر است؟ تنباکوهای میوه ای به دلیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آنها می‌توانند باعث سرطان، انواع بیماری‌های خطرناک و کشنده، آلرژی، آسم و حساسیت شوند.	۱۳۳
دی ۱۴۰۰(خ)	دو مورد از مضرات مصرف تنباکوهای میوه ای را بنویسید. سرطان، انواع بیماری های خطرناک و کشنده، آلرژی، آسم و حساسیت	۱۳۳
خرداد ۱۴۰۱	چرا تنباکوهای میوه ای بیشتر باعث سرطان و انواع بیماری های خطرناک و کشنده می شوند؟ به دلیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آنها	۱۳۳
دی ۱۴۰۱	مصرف کدام گروه از تنباکوها به دلیل افزودنی‌های شیمیایی باعث آلرژی و آسم می‌شود؟ تنباکوهای میوه‌ای	۱۳۳
شهریورماه ۱۴۰۲	تنباکوهای میوه‌ای می‌توانند باعث سرطان، انواع بیماری‌های خطرناک، آلرژی و آسم شوند. تنباکوهای میوه‌ای به دلیل افزودنی شیمیایی و مواد مضر به آنها می‌توانند باعث سرطان، انواع بیماری‌های خطرناک، آلرژی، آسم و حساسیت شوند.	۱۳۳
خرداد ۹۹	در اثر استفاده ..... از قلیان بیماری های منتقله از طریق دهان و دستان فرد آلوده، سلامت افراد دیگر را تهدید می کند. مشترک	۱۳۴
خرداد ۹۹	ضرر قلیان معادل ضرر۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار یا بیشتر است. درست	۱۳۴
دی ۹۷ دی ۹۹ (خ)	به چه دلیل علمی کشیدن قلیان با استفاده از شیلنگ مشترک، اثرات زیانبارتری دارد؟ در اثر استفاده مشترک از قلیان بیماری‌های منتقله از طریق دهان و دستان فرد آلوده، سلامت افراد دیگر را تهدید می‌کند.	۱۳۴
خرداد ۹۸ (خ) شهریور ۹۹ خرداد ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰(خ) شهریور ۱۴۰۱(خ)	دو مورد از آلودگی های قابل انتقال در اثر استفاده مشترک از قلیان را نام ببرید. اگزمای دست – انتقال عفونت‌هایی از قبیل بیماری‌های دهانی – سل – ویروس تب خال – هلیکوباکتری (عامل زخم معده)	۱۳۴
خردادماه ۱۴۰۲	کدام نوع ویروس در اثر استفاده‌ی مشترک قلیان از فرد آلوده منتقل می‌شود؟ تبخال	۱۳۴
خردادماه ۱۴۰۲	در کودکانی که والدین مصرف کننده‌ی مواد دخانی دارند، عفونت کدام بخش گوش، زمینه‌ی بروز بیشتری دارد؟ گوش میانی	۱۳۵
	مقابله با وسوسه مصرف دخانیات	
دی ۱۴۰۰	مصرف سیگار باعث باعث رفع دلشوره و اضطراب و هضم غذا می شود. نادرست (باور غلط)	۱۳۵

دی ۹۷ شهریور ۹۸ (خ) خرداد ۹۹ (خ) دی ۹۹ خرداد ۱۴۰۰ شهریور ۱۴۰۱	دو مورد از عواملی که نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می دهد را بنویسید. ۱. باور غلط به جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن ۲. احساس کاذب مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن ۳. باور غلط اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان ٤. الگوبرداری غلط و منفی از هنرپیشه ها و افراد دیگر ٥. الگوبرداری غلط و منفی از مصرف دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی ٦. باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا می شود. ۷. ساده انگاری و برداشت نادرست در مورد مصرف قلیان به عنوان ماده دخانی کم خطر تر از سیگار ۸. در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی ۹. ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان عمومی	۱۳۵
شهریور ۹۸ شهریور ۹۹ خرداد ۱۴۰۰	چهار مورد از باورهای غلط در مورد مصرف سیگار که موجب سوق دادن جوانان به سوی مصرف دخانیات می شود را بنویسید. سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا می شود. باور غلط به جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن احساس کاذب مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن باور غلط اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان	۱۳۵
دی ۱۴۰۰(خ)	در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی، چه تاثیری بر نوجوانان و جوانان دارد؟ نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می‌دهد	۱۳۵
خرداد ۹۸ (خ) خرداد ۹۸ خرداد ۹۹ شهریور ۱۴۰۱	دود دست دوم مواد دخانی را تعریف کنید. گاهی افراد خودشان مصرف کننده دخانیات نبوده ولی در معرض تنفس دود دخانیات قرار می‌گیرند که به آن دود دست دوم گفته می‌شود.	۱۳۵
	دود دست دوم و سوم مواد دخانی و عوارض آن	
دی ۱۴۰۰(خ)	اگر افراد خودشان مصرف‌کننده دخانیات نباشند ولی در معرض تنفس دود دخانیات قرار گیرند، به آن ..... می‌گویند. دود دست دوم	۱۳۵
خرداد ۹۹ (خ) شهریور ۱۴۰۰	گاهی افراد خودشان مصرف کننده دخانیات نیستند ولی در معرض تنفس دود دخانیات قرار می گیرند که به آن دود دست (دوم – سوم) گفته می شود.	۱۳۵
شهریور ۹۹ خرداد ۱۴۰۰	بوی سیگاری که در محیط پراکنده می شود و لوازم منزل را در بر می گیرد دود دست (دوم – سوم) نامیده می شود.	۱۳۶
دی ۹۷ شهریور ۹۸ (خ) خرداد ۹۹ دی ۹۹ (خ) دی ۱۴۰۰ خرداد ۱۴۰۱	دود دست سوم مواد دخانی را تعریف کنید. بوی سیگاری که در محیط پراکنده می‌شود و لوازم منزل را در بر می‌گیرد، دود دست سوم نامیده می‌شود. (دود دست سوم در واقع دود نیست، بلکه بوی سیگار است که در محیط پراکنده می شود.)	۱۳۶
خرداد۱۴۰۱(خ)	دود دست سوم چه ضررهایی دارد؟ سموم ناشی از سوخت انواع دخانیات از طریق لباس، پوست و مو و وسایل اطراف فرد سیگاری به دیگران منتقل می شود و ثابت شده است که اثر آن حتی تا ماه ها پایدار و تأثیرگذار است.	۱۳۶
خردادماه ۱۴۰۲(خ)	نیکوتین چسبیده به دیوارها و سطوح مختلف، حاصل دود (دست دوم/ دست سوم) می‌باشد.	۱۳۶

خردادماه ۱۴۰۲	بر طبق تحقیقات، اثر دود دسته‌ی ..... بیشتر با ماده‌ی نیکوتین موجود در دود سیگار ایجاد می‌شود. سوم	۱۳۶
	الکل	
خرداد ۱۴۰۱	الکل ماده شیمیایی است که بر عملکرد ..... و روانی افراد تأثیر منفی می‌گذارد. جسمی	۱۳۶
خرداد ۹۸ (خ)	الکل یک ماده (مخدر (اعتیادآور)- دخانی) است و مصرف آن یکی از مشکلات امروزی جوامع بشری است.	۱۳۶
دی ۱۴۰۰(خ)	از بارزترین آثار فوری مصرف الکل (سرطان – اختلال در سیستم عصبی مرکزی) است.	۱۳۷
شهریور ۹۸	آثار فوری مصرف الکل چیست؟ اختلال در سیستم اعصاب مرکزی	۱۳۷
خردادماه ۱۴۰۲	از بارزترین آثار فوری مصرف الکل می‌توان به اختلال در سیستم اعصاب مرکزی اشاره کرد. درست	۱۳۷
خردادماه ۱۴۰۲(خ)	از بارزترین آثار فوری مصرف الکل، اختلال در سیستم اعصاب مرکزی است. درست	۱۳۷
شهریورماه ۱۴۰۲	با افزایش غلظت الکل در خون، فرد مصرف کننده در معرض مسمومیت با الکل قرار گرفته و متعاقب آن آثار منفی روانی و ..... بیشتری را تحمل می‌کند. فیزیولوژیک (یا جسمی)	۱۳۷
خرداد ۱۴۰۱	بارزترین آثار فوری مصرف الکل چیست؟ اختلال در سیستم اعصاب مرکزی	۱۳۷
خرداد ۱۴۰۱(خ)	عدم تعادل در حرکت و اختلال در تکلم، از بارزترین آثار (بلندمدت – فوری) مصرف الکل است.	۱۳۸
دی ۹۷	بارزترین آثار فوری و بلند مدت مصرف مشروبات الکلی را بنویسید. بارزترین آثار فوری : اختلال در سیستم اعصاب مرکزی آثار طولانی مدت : بیماری سیروز کبدی	۱۳۷ و ۱۳۸
خرداد ۱۴۰۰	نوشیدن الکل موجب کاهش اندازه و وزن مغز می شود. درست	۱۳۸
خرداد ۹۹ (خ)	یکی از شایع ترین آثار بلند مدت مصرف مشروبات الکلی، بیماری ..... است. سیروز کبدی	۱۳۸
خرداد ۹۸ دی ۹۸ خرداد ۹۹ دی ۹۹ شهریور ۱۴۰۰	دو مورد از اثرات الکل بر عملکردهای سیستم اعصاب مرکزی را بنویسید. الکل عملکردهای سیستم اعصاب مرکزی را تحت تأثیر قرار داده و آثار خود را به صورت عدم تعادل در حرکت، اختلال در تکلم، کاهش تعداد تنفس و کاهش ضربان قلب و فشار خون نشان می دهد. با افزایش اختلال در سیستم اعصاب مرکزی، کارکردهای حیاتی به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار می گیرند. در موارد شدید، ممکن است شخص دچار کاهش هوشیاری(کما) و حتی مرگ شود.	۱۳۸
خرداد ۹۸ (خ) خرداد ۹۹ (خ)	الکل تاثیر خود را بر عملکرد سیستم اعصاب مرکزی چگونه نشان می دهد؟ عدم تعادل در حرکت – اختلال در تکلم – کاهش تعداد تنفس – کاهش ضربان قلب و فشار خون	۱۳۸
شهریور ۹۸ شهریور ۹۸ (خ) خرداد ۹۹ شهریور ۹۹ خرداد ۱۴۰۰ دی ۱۴۰۰(خ) شهریور ۱۴۰۱(خ)	در اثر مصرف مداوم الکل کبد کارکرد را از دست می دهد. علت چیست؟ اثرات الکل بر تشدید وضعیت کبد چرب و ایجاد سیروز کبدی را بنویسید. چگونه مصرف مداوم الکل باعث ایجاد بیماری کبد چرب و سیروز کبدی می شود؟ به دلیل مصرف مداوم الکل و نبود زمان کافی چربی ذخیره شده در کبد نمی تواند به دیگر مکان های ذخیره سازی بدن منتقل شود و سلول های پر از چربی کبد سبب می شوند که کبد کارکرد خود را از دست بدهد.	۱۳۸
دی ۱۴۰۰	دو مورد از تأثیرات الکل بر سیستم عصبی مرکزی را بنویسید .	۱۳۸

	عدم تعادل در حرکات، اختلال در تکلم، کاهش تعداد تنفس، کاهش ضربان قلب، کاهش فشار خون	
خرداد۱٤۰۱(خ)	اثر مصرف مشروبات الکلی بر اندازه و وزن مغز چیست؟ باعث کاهش اندازه و وزن مغز	۱۳۸
شهریور۱٤۰۱ دی ۱٤۰۱ دی ۱٤۰۱(خ)	از آثار بلندمدت مصرف مشروبات الکلی دو نمونه را بنویسید. بیماری سیروز کبدی و سرطان	۱۳۸
دی ۱٤۰۱	با توجه به شکل، مصرف مقدار اندک مشروبات الکلی: الف چه رابطه‌ای با اندازه مغز دارد؟ موجب کاهش اندازه مغز می‌شود. ب - چه اثری بر برخی توانایی‌های فکری می‌گذارد؟ سبب از دست رفتن برخی از توانایی‌های فکری می‌شود. 	۱۳۸
شهریورماه ۱٤۰۲	یکی از آثار بلند مدت مصرف مشروبات الکلی، همانند مزمن شدن هپاتیت B، منجر به سیروز کبدی می‌شود. درست	۱۳۸
خرداد ۹۸ شهریور ۱٤۰۰	مصرف بلندمدت مشروبات الکلی اثری مشابه با کدام ویروس بر روی کبد دارد؟ ویروس هپاتیت	۱۳۸
خردادماه ۱٤۰۲	یکی از شایع‌ترین آثار مصرف بلند مدت مشروبات الکلی را بنویسید؟ بیماری سیروز کبدی – سرطان	۱۳۸
خرداد۱٤۰۲(خ)	چگونه مصرف الکل سبب تبدیل کبد چرب به سیروز کبدی می‌شود؟ به دلیل مصرف مداوم الکل و نبود زمان کافی، چربی ذخیره شده در کبد نمی‌تواند به دیگر مکان‌های ذخیره سازی بدن منتقل شود و سلولهای پر از چربی کبد سبب می‌شوند که کبد کارکرد خود را از دست بدهد.	۱۳۸
دی ۱٤۰۲	موارد به هم ریخته اثر بلندمدت مصرف مشروبات الکلی بر کبد را به ترتیب پیشرفت آسیب مرتب کنید.(شماره ها را در موارد" الف "تا" د "پاسخبرگ بنویسید). ۱- فیبروز ۲-سرطان کبد ۳-کبد چرب ٤-سیروز کبدی الف(۳(کبد چرب)۰/۲۵(ب(۱(فیبروز)۰/۲۵(۱٦ ج(٤(سیروز کبدی)۰/۲۵(د(۲(سرطان کبد)۰/۲۵)	۱۳۸